

痢

疾

論

痢疾論卷之四

後學楊大任占儀泰閣

黎水孔毓禮以市著韓

同邑陳元節菴全校

諸家治案

東垣治一老僕脫肛日久。近復下痢。裏急後重。白多赤少。此非因食膏粱者也。必多蔬食。或飲食不節。天氣已寒。衣蓋猶薄。寒侵形體。不禁而腸頭脫下者。寒也。滑也。真氣不禁。形質不收。乃血脫也。此乃寒滑氣泄不固。故形質下脫也。當以瀉去其脫。而除其滑。以大熱之劑。除寒補陽。以補

氣之藥升陽益氣以微酸之味固氣上收名曰訶子皮散  
一服減半再服全愈丹溪治一人患痢百餘日百法不效  
六脉促急沉弦細弱左手爲甚晝夜十行視之穢物甚  
少雖下清涕中有紫黑血絲食全不進此非痢也食藏有  
全不進豈可病百日耶且如此症卽宜作瘀血治之以桃  
名之曰瘀血痢疾可也何必曰非痢仁乳香沒藥滑石佐以檳榔木香神麴糊爲丸米飲下百  
餘粒至夜半不動又依前法下二百粒至天明下穢物如  
爛魚腦者二升半先生量  
之否困頓終日漸與粥食而安王肯  
堂曰當用大黃無則難下

又治鄰人鮑子年二十餘因患血痢用瀉藥取效後患痛

風號叫撼鄰里。丹溪曰。此惡血入經絡症。血受濕熱。久爲凝滯。所下未盡。留滯墜道。所以作痛。經久不治。恐成枯糝。遂與四物湯。桃仁。紅花。牛膝。黃芩。陳皮。甘草。煎生薑汁。研潛行散。入少酒飲之。數十貼。又與刺委中。出黑血而安。又治族叔年七十。稟壯形瘦。夏月患痢。至秋百方不應。視之病雖久而神不瘳。小便滯少而不赤。兩手脈俱微。而頗弦。自言胸微悶。食亦減。因悟。此必多年沉積。癖在腸胃。問其生平喜食何物。曰喜食鯉魚。三年無日不用。此積在肺。肺爲大腸之臟。宜大腸之不通。常與澄其源。不流自清。以吳茱。陳皮。青蔥。鹿茸。根。生薑。煎濃湯。和以沙糖。飲一

碗許。自以指探喉中。至半時。吐痰半升如膠。其夜減半。次早又服。又吐半升而痢自止。又與平胃散加白朮黃連。旬日而安。收瀉用木香散。訶黎勒丸。

繆仲淳治少年貴介。暑月出外。飲食失宜。兼以暑熱。遂患滯下。途次無藥。病偶自止。歸家腹痛不已。遍嘗諸藥。人口痛甚。亦不思食。仲淳曰。此濕熱耳。其父曰。醫亦以濕熱治之。而轉劇。仲淳曰。投何藥。曰。蒼朮黃連。枳殼厚朴。陳皮。仲淳曰。誤也。朮性溫而燥。善秘氣。故滯下忌之。即君陰虛人也。尤非所宜。更以滑石一兩爲細末。以升皮汁煮之。別以白芍五錢。炙草二錢。炒黑乾薑五分水煎。調滑石末服之。

須臾小便如注痛立止。

又治秦公蕃病痢。誤投瀉劑。一服痢止。濕熱無自而出。遍攻肢體骨節間。以致項強目赤。肩臂腕膝足脛俱發腫痛。甚不能轉側。仲淳疏方寄之用。白芍石斛牛膝木瓜黃柏。苡仁甘草車前子茯苓。痛雖止。尚不能轉側。更用茯苓薏苡。花何首烏胡麻黃柏炙甘草。服過半愈。其始病時。稍投參朮。而痛劇欲死。此係本來陰虛有火。又加濕熱暑濕交攻。故見此症。名痢風陰虛火多。故不受補。又不宜燥。惟微寒滑平之劑。調之自愈。

按前症人多誤用風藥。不知風藥皆燥。非陰虛有火。人

所能受。但仲淳之方。軟緩無力。故奏效必待逾年。設當日若用丹溪虎潛丸。似乎見功更速。

李士材治兵尊張綱庵。秋間患痢。凡香連枳朴等劑。用之兩月而病不衰。診脈滑而有力。失下之故也。用香連歸芍。陳皮枳殼加大黃三錢。下穢物頗多。脈尚有力。仍用前方。出積滯如魚腦。約數碗。調理十餘日而瘥。

又治撫臺毛如初痢如魚腦。腸鳴切痛。聞食則嘔。所服皆參連木香藿香橘紅芍藥薑蒲而已。後有進四君子湯者。疑而未果。飛艇相招。兼夜而往。診得脈雖洪大。按之無力。候至右尺。倍覺濡軟。士材曰。命火不能生土。亟需參附可。

以廻陽。如翁曰。但用參朮。可得愈否。士材曰。若無桂附。進參朮。無益于病。脾土大虛。虛則補母。非補火也。遂用人參五錢。附子一錢五分。炮薑一錢。白朮三錢。連進三劑。嘔止。食粥。再以補中益氣湯。加薑附十四劑。後即能視事。

喻嘉言治胡太夫人。偶然腹痛。不寧。瀉下數行。醫以痢疾。

治之。其利轉多。

未顯痢形。醫豈治痢。此必先瀉。後有裏急後重。及赤白之色也。

更引通。

因通用之法。用熟大黃丸三錢。下之。遂擾動胃氣。全不思。

食。有似噤口痢狀。喻診之。六脉皆沉。而後應。指模糊曰。此。

非痢疾。乃誤治之症也。今但安其胃。不必治痢。而痢自止。

此症未知病在何時。病在春冬。多屬似痢非痢。若在夏秋。定屬虛痢。冷痢。而誤治之。嘉言概以應補溫者為非。痢疾。



凡診得虛寒脈症。於是以四君子湯爲主治。少加薑桂煖  
便日。此非痢病也。胃之藥二劑。痢果不作。但苦胃中脹痛。必欲加入行氣之  
藥。以冀脹消痛止。而速得進食。喻爭曰。寧可緩于食。不可  
急于藥。蓋以前因藥誤。引動胃氣作楚。如治亂民。惟有安  
之之法。若再加行氣。脹痛必無紀極。堅持前說。卽用陳皮  
和中。亦須炒而又炒。絕不惹動其氣。凡五日未得大便。亦  
不惹動其便。聽其緩緩。痛止脹消。食進便利。共七日全安。  
渾不見藥之功。其實無功之功也。

又治張仲儀初得痢疾。三五行。卽請診行動如常。然得內  
傷之脈。而夾少陰之邪。如何是得內傷之脈。如何是夾少  
陰之邪。何不明白示人。其所以然。

言者以秘之則奇。言診畢。卽云。此症仍宜一表一裏。但表之則平淡不足奇耳。藥中多用附子。方可無患。若用痢門諸藥。必危之道。以示人方是醫案。仲儀以平日深信。徑取前藥。不疑。然病勢尙未著也。及日西。忽發大熱。身重如巨石。頭在枕上。兩人始能夾動。人事沉困。舉家惶亂。忙忙服完表裏兩劑。次早診時。卽時起身。出房。再與參附二劑。全安。如若不辨症用藥。痢疾門中。幾會有此等治法乎。况于疾果著而早見之乎。

又治周信川。年七十三。平素體堅。不覺其老。秋月患痢。久而不愈。至冬月成休息痢。一晝夜十餘行。而目浮腫。肌膚

晦黑診其脉沉數有力。曰此陽邪陷入陰之症也。沉數有也。當下之。何以知當發表。想必前醫數行攻下。而知之者也。吾以法治之。尙可痊愈。明日。再自袖藥來。于是以人參敗毒散。本方煎好。用厚被圍椅上。坐定。置火其下。更以布條捲成驚蛋狀。置椅褥上。殿定肛門。使內氣不得下走。然後以前藥滾熱與服。良久。又進前藥。遂覺皮間有津津微潤。再溉以滾湯。教令努力忍。便不得移身。如此約二時之久。皮間津津總未乾。病者心燥熱。忍不可忍。始令連被卧于床上。是晚止下痢二次。已後改用補中益氣湯。一晝夜止下三次。不旬日而全愈。蓋內陷之邪。欲提之轉從表出。不以逆流挽舟之法施之。其

趨下之勢。何所底哉。故凡遇陽邪陷入陰分。如久瘧久痢。久熱等症。皆當識此意。便其緩緩久久。透出表外。方爲合法。若急而速。則恐纔出。又入。徒傷其正耳。

又治朱孔陽年三十五歲。形體清瘦。素享安佚。夏月因搯訟。奔走日中。暑濕合內。鬱之火而成痢疾。其原已知。是暑濕。晝夜

一二百次。不能起床。以粗紙鋪於褥上。頻頻易置。但飲水而不進食。其病甚厲。肛門如火烙。揚手擲足。躁擾無奈。分

明診脈。弦緊勁急。不爲指撓。分明曰。此症一團毒火蘊結

腸胃之內。其勢如焚。救焚須在頃刻。若二三日外。腸胃朽

腐矣。于是以大黃四兩。黃連甘草各二兩。入大沙鍋內煎。

隨滾隨服。服下人事稍寧。少頃仍如前躁擾。無定見者。不知藥力未到。

反疑藥一晝夜服至二十餘碗。大黃俱煎化。黃連甘草俱有未對。

煎至無汁。如此煎劑。亦是有意炫人耳目。次日病者再求前醫診畢。見脉

勢稍柔。知病可愈。但用急法。不用急藥。退步轉手之快。遂改用生

地黃。麥門冬各四兩。另研生汁。以天花粉。牡丹皮。赤芍。薤

甘草各一兩。煎成和汁。大碗咽之。以其來勢暴烈。一身津

液從之奔竭。待痢止。然後生津液養血。則枯槁一時難回。

今脉既減。則火邪俱退。不治痢而痢自止。豈可泥潤滯之

藥而不急用乎。服此藥。果然下痢盡止。但遺些小氣沫耳。

第三日思食豆腐漿。第四日畧進陳倉米清汁。緩緩調至

旬餘方能消穀。亦見胃氣之存留一線者不可少。此焦頭爛額之客耳。

又治陳汝明病痢。發熱如蒸。昏沉不食。重不可言。至第三日。危急將絕。方請治之。診得脉數大。空虛尺脉倍加洪盛。喻曰。此兩病而湊于一時之症也。內有濕熱。與時令外熱相合。欲成痢症。尙不自覺。又犯房勞。而爲虛寒所乘。以故發熱身重。不食昏沉。皆屬少陰腎經外感。少陰受邪。原要下利清白。此因腸中濕熱。已蒸成豬肝魚腦敗穢之形。故色雖變而下痢則同也。再用痢疾門藥一劑。卽刻不救矣。遂忙以麻黃附子細辛湯一劑。與之。表散外邪。得汗後熱

卽微減。再以附子理中湯。連服二劑。熱退身輕。能食。改用連理湯。九旬日全安。

按脉之大數空虛。知非實症。至犯房勞。病者必然明告。未必一診可得也。但兩尺洪盛。又與陰虛相似。然觀所下之物。有如猪肝魚腦。定是內寒外熱。斷不敢投純陰也。倘子遇此症。只解用附子理中湯。八味地黃湯。至于果兼外感。予只解用五積散。加減以溫散之。斷不投麻黃附子細辛湯之猛烈。然是湯發表溫中。縱非少陰感寒。又何至于敗事乎。但此老論。病解後惟取辛涼。此又何以反取辛熱。故予于前卷中。不得不議其立言之未

脩耳。

又治葉茂卿幼男。病痢。噤口發熱十餘日。嘔吐連聲不斷。關脉上湧而無根。診足脉亦上湧無根。謂其父曰。此非噤口痢之症。乃謂氣將絕之症也。若不下痢。縱嘔吐不食。斷已下痢。嘔吐不食。便名噤口。痢有何是噤口。與非噤口之分。若必虛熱在胃者。方是噤口痢。專補者非噤口痢。未免參黃連一法。噤口痢者。虛熱在胃。壅遏不宣。故覺其飽。不思食。治宜補虛清熱兩法。此因寒苦之藥。所傷不能容食。治惟有專補一法而已。于是以理中湯連投二劑。不一時。痢下十餘行。遍地俱污。茂卿恐藥不對症。求更方。一服。痢之多少。以驗藥之對。喻曰。吾先救胃氣之絕。原不治痢。救與不對。夫是誤也。



胃氣便是治病。病多便是藥。驗何必去。原是不治病。卽治病。人之大小腸。盤疊腹中。甚遠。雖神丹不能遽變其糞。今藉藥力催之急下。正爲美事。烏可疑之。遂與前藥連服二日。人事大轉。思食不噦。痢勢亦減。四日後止。便糟粕以補中。益氣湯調理旬日而安。按噤口發熱。嘔吐連聲。有似乎火。雖因關脉上湧。無根。知胃氣之將絕。然大吐之脉上湧者多。脉旣上湧。重按必然不實。豈便敢用理中而無疑。先生自言此因苦寒之藥所傷。可見前醫用了幾許攻瀉等藥。病因加重。旣有成竹。又以脉證之。而溫補無疑耳。予閱前賢治病案。知其得病情處。原平實不足異。乃故爲隱秘。予嘗小心。

揣出見前賢非不可學若徒然贊嘆稱奇有何益哉

又治葉君藝痢疾初起有表邪未散誤用參朮固表使邪氣深入又誤服黃連涼解大黃推滯治經月餘胃氣不運下痢一晝夜百餘行一夕吐出從前黃連藥汁三五碗嘔至二三次後腸與胃遂打爲一家肉中幽門關門洞開無阻不但粥飲自出卽人參濃膏纔吞入喉已汨汨從腸奔下危急之中諸昆主問曰此症可無恐乎喻曰吾豈不知疾勢之危但姑以靜鎮之而殫力以報知己耳于是以大劑四君子湯煎調禹餘糧赤石脂二末連連與服服後其下痢之勢少衰但腹中痛不可忍君藝曰前此下痢雖多

然尙不痛。服此藥而痛增。未可再服矣。喻曰。此正所謂通則不痛。痛則不通之說也。不痛則危。痛則安。何樂而不痛耶。仍以前藥再進。俟勢已太減。繼用四君子湯倍茯苓。十餘劑全安。

趙養葵治一孕婦。瘧痢交發。醫治兩月餘。瘧止而痢愈甚。又加腹痛。飲食少進。趙曰。虛寒也。以補中益氣加薑桂一服而痢止大半。再一服而反加瘧病大作。主驚恐。趙曰。主吉兆也。向者瘧之止。乃陰盛之極。陽不敢與之爭。今服補陽之劑。陽氣有權。敢與陰戰。再能助陽之力。陰自退。聽方中加附子五分。瘧痢皆愈。大服補劑。越三日產一子。產後

甚健。

吳茱山治一婦。長夏患痢。痛迫下黃黑。曾服香茹枳殼黃連愈劇。其脉兩尺緊濇。此寒傷血也。問其由。乃經時渴飲冷水一碗。遂得此症。與桃仁承氣加玄胡一服。次早下黑血升許。痛止。次用調脾活血之劑而痊。此經凝作痢。不可不知。

按知爲蓄血有之矣。未必知寒所傷。此必問得經時飲冷。與兩尺之脉緊濇合參。故知之也。然旣知是寒邪。何以反用桃仁承氣。寒下乎。想是寒鬱成熱之故也。然此症乃似痢非痢。不是真正痢疾也。

張石頑治春榜項鳴先尊堂下痢血色如莧汁服消尅苦寒芩連大黃之類愈甚不時發熱痞悶六脉瞽瞽虛大右關獨顯弦象按之則芤此氣虛不能統血之候與補中益氣加乾薑肉桂四劑而安。

又治郭然明之室患五色痢。晝夜數十次。兼帶下如崩。此即

兼症。便知其虛。誤服大黃黃連之屬十餘劑。遂隔塞不通。噤口不

食者半月餘。至夜大熱渴燥。帶下如崩。及夜熱渴燥。明如

陰藥。又不可投。惟有八味。此足三陰俱虛之候。與理中加

地黃一湯。爲對症之藥。此少不得。次與加減八味作湯。以

導其陰火而痊。

又治刑部郎中申最菴。高年久痢。血如莧汁。望色便服。本知虛寒。連芍藥之類二十餘劑。漸加呢逆。六脉弦細如絲。遂疏理中。加丁香肉桂。諸醫咸謂血痢無用薑桂。人參之理。遲疑不服。仍啜芩連芍藥。遷延五日。病愈甚。而驟然索食。舉家及諸醫皆以能食為慶。復邀石頑相商。而脉至如循刀刃。此中氣告竭。求救于食。除中證也。世人但知下痢能食為向愈。曷知其有除中之例乎。

又治褚沂水尊堂。秋深久痢。噤口不食者半月餘。但飲開水及瓜穰汁。啜後必嘔。腸鳴絞痛不已。飲瓜汁開水。若係實熱。則能消矣。今飲後嘔脹腸鳴。煩渴悶亂。至夜轉劇。陰之下多亡。所下皆膿血。可知非實熱也。

晝夜百餘次。小水涸澀不通。氣不化也。諸醫束手。石頑切其六

脉皆弦細之力。原屬驗其積沫皆瘀淡晦色。色又屬虛。詢其服

藥皆芩連栝朴之類。因謂之曰。所見之症俱逆。幸久痢脉

弱。尚宜溫補。姑勸一方。用理中加桂苓紫苑調之。紫苑用

服後小便即通。得稍寐。三四日間糜粥漸進。痢亦漸減。更

以理中倍參。伏龍肝泛丸而愈。

又治米元臣子。患五色痢二十餘日。胸膈脹滿。粥飲不能

進。服藥無效。請二醫診視。一用大黃。一用人參。元臣不能

自主。就正石頑。石頑曰。用大黃者。因其脹滿。脉大也。用人

參者。因其痢久不食也。痢久不食。大黃斷斷難用。不食者禁也。

胸滿作脹人參亦難遽投擬服龍肝爲君專溫土臟用濃煎代水煎焦朮茯苓甘草霍木二香炒烏梅一劑痢減食進再劑而止遂不藥調理而起

又治同川春榜陳穎雅觸熱錦歸抵家卽患河魚腹疾半月以來攻尅不效遂噤口粒米不入且都門久食煤火肩背發出赤不疼陷伏不起發呃神昏石頑診之六脉弦細欲絕面色藏陽所下之物晦瘀如爛魚腸膈症雖危殆幸脉無旺氣氣不喘促體無燥擾可進溫補但得補而難腫嫩發便可無慮遂用保元每服人參三錢生黃芪二錢甘草一錢肉桂一錢伏龍肝湯代水煎服一劑而稀糜稍



進再劑而後重少輕。三劑而癰毒竟起。易延壽醫救治其外。確守前方十餘服而安。未嘗更一味也。

一大兵船上婦胎前下痢。產後三日不止。惡露不行。發熱喘脹。法在不救。有同道誤許可治。與藥一服。次早發熱反加。呃逆計無所施。乃同兵丁托言貨船。拉石頑往診。三至一代。直以難治辭之。彼則留往前醫。不使上涯。方知其意。原款巧。仰恐予不往。故不明言其故。當此急迫之際。不與解圍。必致大傷體面。因謂之曰。此症雖危。必從容計議。庶可圖治。彼聞是言。始放原醫。而求藥于予。遂與錢數文。盡一教。令貢砂糖熬枯白湯調服。既可治痢。又能下瘀。且不

傷犯元氣。急與服之。彼欣然而去。其醫得脫。閉門揭家而  
逃。直至數日。大兵去後。寧家過我而謝。

### 痢疾諸方

人參敗毒散。一治痢疾外挾表邪。憎寒發熱。身體疼痛。先  
散表邪。後和裏邪。

人參、茯苓、枳殼、甘草、川芎、羌活、獨活、前胡、柴胡、桔梗、各  
等分。薄荷少許。薑三片。煎服。不虛者去人參。再加荆芥  
防風。名荆防敗毒散。此痢疾發表之第一方也。

倉廩湯。二。治疫痢發熱。前方加陳米一撮。

加減小柴胡湯。三。治症同前。其有外邪稍輕。而有熱者。不

必敗毒散。降用本方。此名涼散法。

柴胡二錢。半夏一錢。人參甘草各五七分。加羌活七分。

防風一錢。不虛者去人參。薑棗煎服。渴者去半夏。少佐

天花粉。腹痛者加白芍藥。

加味桂枝湯。四。痢挾表邪而內無熱者。此湯主之。爲溫散。

法。桂枝二錢。白芍藥一錢二分。炙甘草五七分。羌活五

七分。防風一錢。薑棗煎服。

已上三方俱宜少加厚朴。以防濁氣上壅。

五。續散。

治臟氣素寒之人。外感寒濕。內傷飲食。頭疼身

痛。項背拘急。惡寒嘔吐腹痛。此內溫外散之劑。兼麻黃

桂枝平胃二陳理中枳桔之劑。宜增損用之。

當歸麻黃蒼朮陳皮各一錢。厚朴乾薑芍藥各八分。半夏白芷桔梗茯苓炙草肉桂川芎各五分。虛加人參。薑三片。葱白三莖煎服。再加枳殼八分。

香蘇散

六專治外感風寒。內傷飲食。宜隨症加減。

香附

生

紫蘇

各二

陳皮

去白

一錢

甘草

七分

加葱薑煎。

邪重再

加發散藥。如羌防柴葛之屬。積重再加消積散。如麴蘗

山查之屬。或痰藥。或氣藥。無不可對症增入。此中道而

立之方。極宜於時用者也。

葱鼓益元散

七

夏月暑熱兼挾外邪。欲發散清利者。此方

兼擅其長大有神功。

蒸白三寸豆豉五十枚煎湯調益元散二三錢。

四逆散

北柴胡白芍枳實炙甘草各等分。

黃芩芍藥湯。此治熱痢之主方。芍藥湯。此清熱導滯等方。皆以此方爲祖。加入順氣消食涼血之味而變具其名也。

條黃芩白芍藥

各二錢

甘草

一錢

水一鐘

半煎

八分

溫服

腹

痛甚者加桂二分。膿血稠粘者加當歸黃連各五六分。

芍藥湯

此和血調氣清熱之藥。

和血則便紅自愈。

調氣

則

便紅自愈。

調氣

則

便紅自愈。

調氣

則

則後重自除。

白芍藥一兩、當歸、黃連、各五錢、枳榔、木香、甘草、各二錢、大黃、三錢。

黃芩、五錢、官桂、一錢、五分、每服半兩。

聶氏痢疾主方 十一 治熱滯成痢。此方最驗。虛寒者禁服。

川黃連、條黃芩、杭白芍、生用、山查肉、各一錢、陳枳殼、去穢。

川厚朴、去皮薑汁炒、堅栝、榔厚、青皮、去穢各八分、當歸、地榆、甘草、

各五錢、紅花、酒洗、桃仁、炒去皮尖碎、南木香、二分、水二碗、煎

一碗、去渣、空心服。渣再煎服。單白無紅者、去地榆、桃仁。

加去白陳皮、四分、木香、三分、滯瀉者、加酒炒製大黃、二

錢、服一二劑、仍除之。

改定聶氏痢疾主方 十一

川連

六分

條黃芩

一錢二分

白芍

一錢二分

上三

味俱用酒炒

山查肉

枳

殼厚朴

各七分

榔青皮

各七分

當歸

各五分

甘草

各五分

地榆

各五分

紅花

各三分

桃

各七分

仁泥

各七分

木香

各三分

白芍

以下法製悉如前方應下者加酒

製大黃

製大黃

香連丸

十二

治熱痢赤白裏急後重

治熱痢赤白裏急後重

川黃連

十兩切如豆粒用淨吳萸五兩二味用熱水拌

細同炒至黃連紫黃色為度去吳萸不用每黃連製淨

一兩入南木香二錢五分共為末醋糊丸如桐子大每

服七十九食前空心服米飲下

服七十九食前空心服米飲下

戊己丸 十三 治濕熱瀉痢腹痛。

川黃連

六兩 吳茱萸 揀去閉口者一兩

同黃連煮熟乾加白芍藥。

酒炒六兩神麴糊丸米湯送下。

白頭翁湯

十四

治挾熱痢下膿血。

白頭翁 川黃連

炒黑黃柏 炒黑秦皮 各一錢五分

水煎服。

黃連解毒湯

十五

此湯純是苦寒非痢家所宜用惟有內

火炎熾嘔逆不入食者暫用以降衝逆之火本方去黃

柏加枳殼木香。

黃連黃柏黃芩梔子各等分。每服五錢。

大黃黃連瀉心湯

十六

戴原禮曰純下血而色鮮紅濃厚。



者心脾伏熱也。此湯主之。石頑曰。穢積在下。惡氣薰蒸。嘔逆食不入者。本方加木香。

大黃

錢五黃連二錢五分

二味以微沸湯漬之。須臾絞去渣。分

溫再服。

甘草瀉心湯

十七

治脾胃不弱。頭痛心煩。手足溫熱。未多

服涼藥者。此乃毒氣上衝心肺。所以嘔而不食。本湯去

大棗。易生薑。此症胃口有熱。不可用溫藥。半夏錢四黃連

錢一黃芩炙甘草人參

各二錢

紅棗一個。水煎服。

大柴胡去半夏湯

十八

柴胡條芩白芍枳實大黃生薑大棗

大黃丸

十九

治膿血稠粘熱甚日夜無度凡痢疾之當通

利者。

錦紋大黃酒蒸爲丸。赤多者溫酒下百丸。白多者淡薑

湯下七十九。

百順丸

二十

治一切陽邪積滯實熱秘結等症。

錦紋大黃一斤。猪牙皂角一兩六錢炒微黃爲末。蜜丸

如菉豆大。每服一二錢。隨證作湯送下。

巴豆丸

廿一

治積滯屬寒熱者不可輕投。

巴豆去殼研炒。蠟丸如龍眼大。空心服。

大承氣湯

廿二

古法云痢疾之當通者悉用大承氣湯加

減毒可久非之曰痢邪膠滯腸胃惟宜磨刮疏通若用承氣大下之徒傷胃氣膠滯必不可去此論極當子深服之

大黃

五錢

厚朴

兩一

枳實

一大

芒硝

三錢

先煎枳朴將熟內大黃煮二三沸傾碗內和芒硝服

防風通聖散

廿三

兩解內外之邪用以治痢宜去石膏桔

梗芒硝

防風荆芥連翹麻黃薄荷川芎當歸白朮白芍山梔

大黃

酒炒

芒硝

黃芩

石膏

桔梗

各一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

加薑蔥煎服

枳實厚朴湯

廿四

河間曰大便秘濇久不愈恐大陰傳少

陰為痢先與枳實厚朴湯以防其變予辨之在河間論中。

厚朴

一兩

枳實

一兩

訶子

一兩半

木香

五錢

黃連

二錢

炙甘草

三錢

大黃

二錢

首烏湯

廿五

痢不應攻下而後重秘迫難支用此湯亦能

滑利。

赤何首烏生者五錢。郁李仁當歸各一錢五分。火麻仁

二錢。枳實六七分。

枳實導滯丸

廿六

治傷濕熱之物不能施化腹內硬痛積

滯泄瀉。

大黃一兩、枳實炒、黃芩炒、黃連酒炒、神麴炒、五錢、白朮土炒、茯苓各、澤瀉二錢、蒸餅爲丸、多寡量服。若氣滯後重者，加枳、榔、木香。

大健脾丸廿七。此方健脾胃、滋穀氣、除濕熱、寬胸膈、去痞滿。凡痢症清解之後，愈而未愈，及脾胃虛而挾滯挾熱者，尤宜之。

人參、白茯苓飯上蒸、廣陳皮各二兩、枳實飯上蒸、青皮米醋燉、歸山查肉飯上蒸、白朮土炒、穀牙炒、一兩、白朮去殼、木香各五錢、川連平。常調養者，只用三五錢治病。須看邪熱。

之盛衰以定分兩之多少。每連一兩六錢。用吳萸五錢。浸炒赤色。去吳萸同爲末。長流水煮。荷葉老米粥搗丸。菜豆大。每服百丸。食前白湯下。

四君子湯廿八助脾胃之祖方。

人參二錢白朮二錢茯苓各二錢炙甘草一錢加薑棗或粳米百粒。

異功散廿九痢疾胃虛氣逆不進飲食。

四君子湯加陳皮各等分薑棗煎。

六君子湯三十治胃虛生痰嘔吐吞酸飲食艱進。

四君子湯加陳皮半夏各一錢五分。

香砂六君子湯 三十一 治症同上而氣逆不調者。

六君子湯加砂仁木香或藿香各隨所宜薑煎。

六神散 三十二 治脾胃虛而泄瀉。

四君子湯加淮山扁豆倍用。

參苓白朮散 三十三 治脾胃虛泄瀉食減。

白朮二兩人參山藥扁豆蓮子肉各一兩桔梗砂仁薏苡

仁茯苓炙甘草各一兩共為細末每服二錢米湯調下或

煉蜜為丸服。

七味白朮散 三十四 治虛熱作渴渴瀉痢後津陷作渴。

四君子湯加藿木二香各等分家乾葛蒸熟倍之如無

氣滯吐瀉。去二香以避燥而耗氣。

保元湯三十五補氣虛之祖方。

黃芪二錢人參二錢炙甘草一錢肉桂附子當歸熟地黃芩

可隨症加入。

生脉保元湯三十六治氣虛喘促。口乾咳嗽。

保元湯加麥冬一錢。五味三五分。

補中益氣湯三十七治一切清陽下陷。中氣不足之症。凡

痢疾既久。不特虛者氣陷。熱者亦必氣陷。升舉之法。萬

不可少。但當加減及時用之。

黃芪錢五白朮一錢廣陳皮五升麻三北柴胡



三人參錢一當歸錢七炙甘草錢一薑棗煎服。

調中益氣湯三十八治饑飽勞役損傷脾胃元氣不足其

脉弦洪緩而沉按之中指下時得一瀉或上飲下便或大便瀉滯或夏月殄泄米穀不化或便後見血或見白膿。

炙黃芪錢一人參炙甘草茅山蒼朮炒各五分橘紅木香柴胡

升麻各二分一方有芍藥三分水煎服。

升陽除濕防風湯三十九東垣云大便閉塞或裏急後重

數至圓而不能便或有白膿或少有血慎勿利之宜升陽除濕防風湯舉其陽則陰自降矣。

防風錢二白朮錢二白茯苓錢一白芍藥錢一茅山蒼朮酒洗去皮  
先將蒼朮水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食  
前服。

三奇散四十治痢疾下重。

黃芪二兩枳殼二兩生一一防風二兩共為末每用米飲調服二錢。  
一病痢解頻大約風入腸胃之中遂覺下部畏風時如  
風吹肛門與本方十分之一煎服一劑頓愈。

八珍湯四十一治氣血兩虛調和陰陽。

人參錢二白朮錢二土茯苓錢二炙甘草錢一熟地黃錢二當歸錢二  
白芍藥錢二酒炒錢一川芎錢一酒炒錢一水煎服。

十全大補湯 四十二

八珍湯加黃芪一錢。肉桂六分。薑棗煎服。

人參養營湯 四十三

人參、炙芪、當歸、白朮、炙甘草、肉桂、廣皮、各一錢。熟地黃、五

味、茯苓、各五分。白芍藥、酒炒、一錢五分。薑棗煎服。

歸脾湯 四十四

人參、炙黃芪、白朮、炒、棗仁、茯神、各二錢。遠志、肉、當歸、各一

錢。炙甘草、木香、各五分。龍眼肉、七枚。水煎服。

七珍散 四十五

人參、炙黃芪、白朮、茯苓、炙甘草、淮山藥、粟米、薑水煎服。

人參胃風湯 四十六 治風冷腎虛入客腸胃水穀不化泄

瀉注下及腸胃濕勢如豆汁或下瘀血日夜無度人參

白朮上炒茯苓常歸川芎炒白芍藥酒炒桂枝各等分

右為粗末每服二錢入粟米數粒同煎食前服

六桂飲 四十七 治久痢如死猪肝色或五色雜下此乃五

臟俱虛脾氣將絕故腸胃下脫用此方以救萬一人參

附子白朮木香茯苓肉豆蔻

小建中湯 四十八 治痢疾脉弦腹痛裏急

中桂三錢白芍藥六錢炙甘草一錢生薑三錢棗一個煎去粗入

飴糖三五錢微火解服

一鄧姓婦患痢脈遲緩食減服理中則燥服建中則安可知二方之各有所宜矣

黃芪建中湯 四十九 治痢疾多汗腹痛裏急

即小建中湯加黃芪

八味建中湯 五十 治中氣不足手足厥冷小腹變急腹中

寒痛四肢痠疼及無根失守之火出于肌表而為疹斑

人參炙甘草 各一錢 炙黃芪當歸白芍 酒炒桂心 各二錢 半夏

附子 製各二錢 每服五錢薑三片棗二枚水煎服

乾薑甘草湯 五十一

炙甘草炮乾薑各等分溫服

理中湯 五十二 治冷痢腹痛霍亂嘔吐不渴。

白朮二錢人參炮乾薑炙甘草各一錢水煎服。

理中丸 五十二

卽前湯用蜜丸如雞子黃大。

附子理中湯 五十三 治症如前而陰寒之甚腹痛厥冷等

症。

理中湯加熟附子一二錢。

枳實理中湯 五十四 治中寒食滯結胸。

理中丸料加枳實茯苓蜜丸如雞子黃大熱湯化服連進。

治中湯

五十五

治痢疾脾胃不和嘔逆不食虛痞中滿理

中湯加青皮陳皮各等分每服五錢水煎嘔加半夏

連理湯

五十六

治傷暑瀉而作渴外感暑熱內傷生冷非

此不可

理中湯加黃連茯苓

椒梅理中湯

五十七

治痢疾誤服冷藥中寒吐虵

理中湯加烏梅一個川椒一錢

吳茱萸湯

五十八

吳茱萸一升泡人參三兩大棗十二枚生薑六兩

烏梅丸

五十九

治痢疾寒厥吐虵

烏梅三百個，細辛、桂枝、人參、炮附子、黃柏各六兩、黃連一斤、乾薑十兩、川椒去實歸兩、各四、苦酒浸烏梅一宿，去核蒸熟。

和藥蜜丸

乾薑、黃連、黃芩、人參湯六十

乾薑、黃連、黃芩、人參各等分，水煎分溫服。

茜根丸六十一 治毒痢下血如雞肝，心煩腹痛，羸注下血。

茜根、升麻、犀角、地榆、當歸、黃連、枳殼、白芍各等分，為細

末，醋煮紅曲丸如梧桐子大，空心米飲下七十丸。

黃連犀角散六十二 治狐惑肝門生蟲。

犀角鎰一兩、黃連五錢、木香一錢、烏梅十個，為散，每服二錢，水



海光寺

六十三  
治惡心嘔噦

錢齊

陳皮通草

五各一分錢

本草分五

水煎服。

六十四

治呃逆困于虛熱者

炒蓮升蘊

参。

六十五

治。呃。逆。困。于。寒。逆。者。

分人參減半薑三片嚴氏無人生薑

六十六

肉、  
錢二  
淮

山  
錢二  
丹

皮五錢

扶琴

五一  
分錢  
淨

五分鐘

熟附子五分 肉桂五分 白水緩火煎。空腹服。本方寧丸名。

八味地黃丸。

香砂八味湯六十七 治腎虛氣不歸原呃逆。

八味湯加沉香五分 砂仁末五分。

生脉八味湯六十八 治腎虛氣促。

八味湯加人參麥冬一錢 五味子五分。

六味地黃湯六十九。

熟地四錢 棗肉二錢 淮山二錢 丹皮一錢 茯苓一錢 澤瀉各一錢 白水緩

火煎。空腹服。

生脉六味湯七十。

六味湯加人參麥冬各一錢五味子三分。

駐車丸

七十一 治陰虛下痢發熱膿血稠粘及休息痢。

阿膠

三兩黃連三錢炒當歸各五錢乾薑兩一醋煮阿膠將四味

爲丸梧桐子大每服五十丸晝夜三服米飲下。

千金黃連湯

七十二 治赤白痢。

阿膠

三錢黃連當歸各一錢五分泡黑薑一錢加黃柏炒黑炙甘

草各一錢石榴皮一錢五分除阿膠煎去粗肉膠烱化。

溫分三服。

阿膠駐車丸

七十三 治冷熱不調傷犯三陰腹痛下膿血。

一阿膠

三兩黃連三兩當歸乾薑各一兩木香黃芩赤石脂龍骨

醋煨水飛 厚朴五錢 薑炒米飲丸 梧桐子大 每服二十九 薑

夜各一服米飲下

歸連丸 七十四 治陰虛下痢五色及孕婦噤口赤白

阿膠二兩 黃連當歸各一兩 黃芩 黃柏炒黑各五錢 艾葉一兩 除

阿膠為細末以醋二升煮艾至一升去滓入膠溶化為

丸 菴豆大 每服六七十丸 晝夜三服 米飲下

黃連阿膠湯仲七十五 治心煩不卧泄熱養營

黃連四兩 黃芩 芍藥各二兩 雞子二枚 阿膠三兩 先煮三物去

渣內膠烱化少冷內雞子攪勻服七合日三服

海藏黃連阿膠湯 七十六 治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連四兩 阿膠黃柏各一兩 山梔子五錢 每服四錢。

阿膠梅連丸七十七 治陰虛五色痢至夜發熱。

阿膠黃連各三兩 當歸一兩 泡黑乾薑一兩 黃柏炒 赤

芍烏梅肉炒枯各一兩 醋煮阿膠為丸梧桐子大每服三

五十九丸晝夜三服米飲下。

五苓散七十八 治便秘而渴中暑身熱頭痛霍亂吐瀉。

白朮茯苓猪苓澤瀉各等分肉桂少用為末每服三錢。

傷暑者加硃砂燈煎。

理苓湯七十九 此溫中利水之劑可治寒濕浮腫。

理中湯合五苓散。

五苓散  
前夜九方  
醫和未成  
刑疾者若  
既成痢疾  
則不當利  
不悉前論

春澤湯入十治氣虛傷暑小便不利大便泄瀉而渴。

五苓散加人參甘草乃四君五苓合爲一方也。

益元散

入十一

治中暑煩熱小便不利河間云治痢之聖

藥蓋亦治之于未病也不可錯會。

滑石

水飛

六兩粉甘草末

一兩

每服二三錢新汲水調下。

本

方加紅曲五錢治赤痢加乾薑五錢治白痢。

硃砂益元散

入十二

暑氣傷心此方能引心經暑氣從小

便出。

益元散加硃砂三錢。

良方厚朴丸

入十三

治寒中洞洩實滯脹滿等症。

厚朴、乾薑各等分，為末，水糊丸。桐子大，每服五十丸，米飲下。

五物香茹飲 八十四 治一切感冒暑氣。

香茹一兩、厚朴一兩、薑一兩、扁豆一兩、甘草各五錢、黃連三錢、藳陳三錢、冷服。

六和湯 八十五 治夏月痞滿喘咳浮腫便赤泄瀉欲成痢疾。

疾。

砂仁炒、半夏泡、杏仁炒去尖、人參、甘草各一兩、赤苓、藳香、扁

豆去皮薑汁各二兩、木瓜各二兩、香茹、厚朴各四兩、薑一兩、藳陳一兩、煎。

導水茯苓湯 八十六 治痢變水腫小便閉塞用此漸利而

愈。

赤茯苓、麥門冬、澤瀉、白朮、各三錢、桑白皮、紫蘇、檳榔、木瓜、

各一兩、大腹皮、陳皮、砂仁、木香、各七錢五分、俱咀咬、每服一二

兩、水二鍾、燈草三十莖、煎八分、食前服、如病重者、用藥

五兩、倍加麥冬及燈草半兩、以水一斗、砂鍋內熬至一

大碗、再熬至一鍾、五更空心服、粗再煎、連進三服、自然

小水通利、

金匱腎氣湯、八十七、治痢、誤藥、脾腎大虛、變成腫脹、小水

不利、

熟地黃、四錢、茯苓、三錢、棗肉、淮山、丹皮、澤瀉、牛膝、車前子、附

子、肉桂、各一錢、流水煎、空腹服、



金匱腎氣丸

八十七

前方爲丸。

千金溫脾湯 八十八 治積久熱痢赤白。

大黃

錢四

人參

甘草

炮薑

各二錢

熟附子

錢一

水煎

溫服

冷痢

去甘草

加桂心

三錢

倍人參

薑附減

大黃一錢

此卽大

黃附子湯

加薑桂人參

以溫中滌垢也。

千金羊脂煎

八十九

治久痢不瘥。

羊脂

一碁子

大白蠟

二碁子

大黃連末

一升

酢七合

取

稠冬蜜

七合

煎取五合

烏梅肉

二兩

亂髮灰

汁洗去垢

膩燒末

一升

上七味合入銅器中

湯上煎之

攪可丸如

丸如

丸如

丸如

丸如

丸如

丸如

丸如

梧桐子大每服三十九日三。葶子大小如方寸七。  
石頑曰羊脂性滑利千金用治久痢不瘳專取滑利以  
通虛中留滯也。其后且有羊脂阿膠蜜蠟黍米作粥深  
得炎帝本經補中寓瀉之旨。

白頭翁加阿膠湯 九十治挾熱痢下膿血及產後痢不止。  
本湯加阿膠三錢炙甘草一錢五分先煮原五味去滓  
內膠溶化分溫三服。

千金三物膠艾湯 九十一治妊娠血痢。

阿膠艾葉石榴皮

各一兩

三味水煮去粗內膠令烊盡分

三服欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行者加黃柏

黃連各一兩。防己乾薑各五錢。附子一枚。曲五錢。蜜丸。  
梧桐子大。每服二十丸。日三。漸加至三四十丸。  
伏龍肝湯丸。九十二。治胎前下痢。產後不止。及元氣大虛。  
瘀積小腹結痛。不勝攻擊者。

炮黑山查一兩。熬枯。砂糖二兩。二味一半爲丸。一半爲末。川

伏龍肝一兩。煎湯代水。煎末二錢。送前丸二錢。日三。夜

二服。一晝夜。令盡氣虛。加人參二三錢。以駕馭之。虛熱

加炮薑。肉桂。茯苓。甘草。兼風寒。加蔥白。香豉。膈氣不舒。

磨木香數匙。調服。

桃花湯。九十三。治少陰病。腹痛。下利。便膿血。

赤石脂一斤。乾薑兩。梗米升。升升。漢云。桃花湯主痢。虛下血。虛且寒。非乾薑之溫。赤石脂之滑。且重。不能止。煎用梗米之甘。引入腸胃。

大桃花湯九十四

赤石脂一斤。乾薑兩。當歸兩。龍骨兩。煨牡蠣各六錢。附子一枚。芍藥各。白朮人參。各三錢。炙甘草二錢。水煎。分三服。臍下加陳皮。

桃花丸九十五。治冷痢。臍下攪痛。

乾薑赤石脂。各等分。蜜丸。如豌豆大。服十九丸。日三服。至二十九。

訶子皮散 九十六

栗殼陳皮各五分炮薑六分訶子皮七分為細末作一服水二盞煎至一盞和粗空心熱服

訶黎勒散 九十七

訶子十枚煨一味為散粥飲調和頓服

木香散 九十八

治虛寒滑泄不止

炙甘草乾薑各二兩附子一兩加丁香木香丁香豆蔻訶子

肉赤石脂各一兩為散每服三錢陳米湯下

二石理中湯 九十九

治開腸洞泄

理中調赤石脂水飛禹餘糧煨水服

其人養臟湯 一百治瀉痢日久赤白已盡虛寒厥用

栗殼去蒂蜜炙訶子麵裹煨肉豆蔻麵裹煨木香二

錢三兩六錢肉桂八錢人參六錢白朮炒當歸各六錢白芍炒生甘

草一兩每服四錢臟寒甚加附子十方無當歸

丹溪云久痢虛滑當用訶子豆蔻白朮半夏之類以瀉

之甚加牡蠣然必陳皮為佐若太瀉亦能作痛

四神丸 百一治脾腎虛寒瀉利腹痛等證

破故芷炒肉豆蔻麵裹煨北五味二兩吳茱萸炒

末百枚同薑八兩煮爛取肉搗丸如梧桐子大每服

七八十九空心食前白湯下古方用木香以陰惡燥故

以五味代之。

獨活寄生湯 百二 治痢後風。

獨活桑寄生 如無以續杜仲 炒斷 秦膠 防風 細辛 當歸

川芎 白芍 熟地 牛膝 人參 茯苓 甘草 桂心 各等分 每服

四錢。

大防風湯 百三 治痢後脚膝軟痛不能步履名曰痢後風。

人參 白朮 防風 羌活 熟地 杜仲 各二錢 黃耆 白芍 牛膝 附

子 各一錢 官桂 炙甘草 各五錢 水煎服 一方有當

歸無官桂加薑七片。

虎骨四筋丸 百四

宣州木瓜

去天麻、肉蓯蓉、淨牛膝、焙乾、各附子、炮二

虎骨

一兩、先將前四味用無灰酒五升浸、春秋五日、夏

三日

冬十日、取出、倍乾、入虎骨、附子、共為末、用前浸藥

酒打

麴丸、梧桐子大、每服五十九、食前溫酒送下

解行散

百五、治痛風腰以下濕熱流注

黃柏

一味、為末、薑汁酒調服

又薑汁

炒數次、為末、每服錢半、空心酒下、治濕熱足膝

腫痛

參附湯

百六、治痢、誤服寒藥、至真陽大虛、厥逆、白汗、呃逆

頭暈



人參一兩。附子五錢。

痢家要方

小建中湯。脉弦腹痛要藥。香連丸。黃芩芍藥湯。清熱要藥。補中益氣湯。升舉後重要藥。未可投此湯者。當以三奇散代之。理中湯。溫中要藥。未可投此湯者。先與乾薑甘草湯。四君與功。補脾胃要藥。六味八味湯。補腎要藥。大健脾丸。痢疾斗虛牛黃。調理脾胃要藥。

痢症諸藥

發散 柴胡羌活獨活防風桂枝葱白生薑  
清熱 條黃芩白芍川連知母石斛

攻下

製大黃生大黃巴豆

潤滑

生何首烏火麻仁郁李仁羊脂當歸

分利

滑石澤瀉赤茯苓猪苓木通車前子芍藥

消食

山楂神麴穀芽厚朴砂仁青皮枳實

調氣

木香陳皮香附砂仁白蔻蟲白

破氣

枳實枳殼檳榔厚朴青皮

補氣

黃芪白朮炒焦用人參炙甘草

涼血

槐角槐花生白芍生地黃地榆牡丹皮白頭翁

行血

歸尾赤芍丹皮滑石紅花蒲草桃仁玄胡索乳香

沒藥紅麴

補血

當歸、白芍、生地黄、製首烏、阿膠

補脾

白朮、人參、茯苓、炙甘草、扁豆、淮山、米仁、蓮子

溫熱

炮乾薑、肉桂、附子、益智、吳茱萸

升上

升麻、柴胡、黃芪、防風、乾葛

平

桑椹、枳實、枳殼、厚朴、薏苡仁

一

生地、熟地、黃阿膠、麥冬、丹皮、白芍、知母、黃柏

消暑

香薷、扁豆、滑石、木瓜

補腎

熟地、續斷、杜仲、補骨脂、牛膝、菟絲、五味、山茱萸、鹿

固

附子、肉桂、淮山、小茴

固

肉豆蔻、訶黎勒、吳茱萸、烏梅、椿根皮、赤石脂、禹餘糧

伏龍肝。固正。蓮子。五味。

丹溪云。厚朴大溫而散氣。大能虛人。滯積者。即去之。根殺亦耗氣。比之厚朴少殺。比陳皮少。正滯退亦去之。只用陳皮和諸藥。

戴原禮云。諸血痢不止。宜多用地榆。血熱者用之。又云。黑草薑。

每服一錢。米飲調下。治血痢神效。血寒者用之。仲景云。大腸有

寒者。其人下重便血。○戴云。乳香沒藥少許。可止腹痛。又

云。凡疏利而仍然後重者。陽氣不升也。藥中加升麻。

繆仲淳治痢。每用升麻滑石。先輩常用紅麴扁豆。

張石頑云。赤痢初起。宜加玄胡索。故散血積。又云。乾薑甘

草。滿。理。脾。胃。肉。桂。茯苓。專。伐。肝。邪。常。州。伏。龍。肝。煎。湯。澄。清。  
代。水。煎。藥。白。朮。必。炒。極。焦。

醫爲道。非讀書不能明其理。非折肱者不能神于用。若  
空言寒熱臆剖。是非欲其閉門造車。出門合輒也。鮮克當  
矣。早自成立。而後儒書之暇。喜讀醫書。既長好之。益篤。雖  
補弟子員。而舉業其旁及耳。嘗以藥方試輕病。有效輒自  
喜。既而效益多。問者日益衆。遂至于窮年矻矻。日奔道路。  
夜繼膏油。泰岐黃註仲景。不遑寧處。每恨瘟疫而外。惟痢  
疾最險惡。能死人于數日之間。而古鮮明定論訓。可爲章  
程。初遇聶可久奇方妙論。甚喜之。喜其簡而明。約而易循  
也。旣而疑之曰。痢疾重症也。一方可盡其用乎。業之久。治  
痢旣多。不惟不遵聶氏。卽河間丹溪亦時違時不遵焉。痢

盛之年。求予者。予悉心治之。頗獲效。于是鄉邑問予曰。子于痢疾。得異傳乎。予笑而應之曰。唯唯。誠有之。行將出吾異傳。以公諸人可乎。今老矣。不敢食前言。遂編輯予之目見耳聞。親手試驗者。彙成一帙。以待同志者。採擇焉。黎川孔毓禮以立又識。